治療スケジュール

J-33

*レジメン名	DBd療法(1コース目day8～21)(IR有)(21日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ16mg/kg：day8・15、ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ1.3mg/㎡：day8・11、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body：(div)day8、(po)day9・11・12

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(8)	d(11)	d(15)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	開始時速度50mL/h	○		○			
		1日1回									
		投与速度適宜調整し、流しにも使用									
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	60分	○		○			
		デキサート注射液	19.8	mg		○		○			
		1日1回									
		点滴開始時にカロナール、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服									
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液1000mL	1000	mL	(day8) 50→100→150→200mL/h	○					
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg		○					
		1日1回									
		総量1000mLに調製									
		(day8) 50→100→150→200mL/h で									
		(1時間毎50mL/h up)　最大200mL/h									
		無菌製剤処理料1									
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	(day15)day1・8のIR有無で異なる			○			
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg				○			
		1日1回									
		総量500mLに調製									
		(day15)(50→)100→150→200mL/h で									
		day1・8に100mL/h以上でIR無なら100mL/hで開始可									
		(1時間毎50mL/h up)　最大200mL/h									
		0.2又は0.22μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
皮下注射		生理食塩液20mL	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○				
	☆	ベルケイド3mg	1.3	mg/㎡	数秒	○	○				
		1日1回									
		1Vあたり生食1.2mLで溶解									
		無菌製剤処理料1									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	20	mg/day	day9,11,12(※)						
		1日1回　朝食後									
		※75歳を超える、過少体重(BMI：18.5kg・㎡未満)、ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良のDM又はｽﾃﾛｲﾄﾞ療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者は省略可。									
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day8・15						
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day8・15						
		1日1回 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分前									
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day8-21						
		1日1回 朝食後									
内服		バクタ配合錠	1	錠	day8-21						
		1日1回 朝食後									