

治療スケジュール

J-37

*レジメン名	DLd療法(1コース目 day1~7)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	ダラツムマブ 16mg/kg: day1、レナリドミド 25mg/body: day1~7、デキサメタゾン 20mg/body: (div)day1、(po) day2

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(7)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液500mL 1日1回 投与速度適宜調整し、流しにも使用	500	mL	開始時速度50mL/h	○			
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液100mL デキサート注射液 1日1回 点滴開始時にカロナール、ポララミン内服	100	mL	60分	○			
			19.8	mg		○			
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液1000mL ☆ ダラザレックス点滴静注 1日1回 総量1000mLに調製 50→100→150→200mL/hで (1時間毎50mL/h up) 最大200mL/h 0.2又は0.22 μ mフィルター使用 無菌製剤処理料1 休薬完了	1000	mL	50→100→150→200mL/h	○			
	☆		16	mg/kg		○			
		以下別オーダー							
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg) (レナリドミド) 1日1回 朝食後	25	mg/body	day1~7				
内服	☆	レナデックス錠(4mg) (デキサメタゾン) 1日1回 朝食後 ※75歳を超える、過少体重(BMI: 18.5kg・m ² 未満)の患者は省略可。	20	mg/day	day2(※)				
内服		カロナール錠(500mg) ポララミン錠(2mg) 1日1回 ダラザレックス投与60分前	2	錠	day1				
			1	錠	day1				
内服		ビクロックス錠(200mg) 1日1回 朝食後	1	錠	day1~7				
内服		バクタ配合錠 1日1回 朝食後	1	錠	day1~7				