治療スケジュール

J-38

*レジメン名	DLd療法(1コース目day8～28)(IR無)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ16mg/kg：day8・15・22、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ25mg/body：day8～21、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body：(div)day8・15・22、(po)day9・16・23

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	開始時速度50mL/h	○	○	○			
		1日1回									
		投与速度適宜調整し、流しにも使用									
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	60分	○	○	○			
		デキサート注射液	19.8	mg		○	○	○			
		1日1回									
		点滴開始時にカロナール、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服									
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	(day8) 50→100→150→200mL/h	○	○	○			
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg	(day15・22)day1・8のIR有無で異な	○	○	○			
		1日1回									
		総量500mLに調製									
		(day8) 50→100→150→200mL/h で									
		(day15・22)(50→)100→150→200mL/h で									
		day1・8に100mL/h以上でIR無なら100mL/hで開始可									
		(1時間毎50mL/h up)　最大200mL/h									
		0.2又は0.22μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg)　(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ)	25	mg/body	day8～21						
		1日1回　朝食後			(day22～28休薬)						
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	20	mg/day	day9,16,23(※)						
		1日1回　朝食後									
		※75歳を超える、過少体重(BMI：18.5kg・㎡未満)の患者は省略可。									
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day8・15・22						
		ポラプラミン錠(2mg)	1	錠	day8・15・22						
		1日1回 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分前									
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day8-28						
		1日1回 朝食後									
内服		バクタ配合錠	1	錠	day8-28						
		1日1回 朝食後									