治療スケジュール

J-40

*レジメン名	DLd療法(2ｺｰｽ目)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ16mg/kg：day1・8・15・22、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ25mg/body：day1～21、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body：(div)day1・8・15・22、(po)day2・9・16・23

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	開始時速度50mL/h	○	○	○	○			
		1日1回										
		投与速度適宜調整し、流しにも使用										
側管点滴注射メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	60分	○	○	○	○			
		デキサート注射液	19.8	mg		○	○	○	○			
		1日1回										
		点滴開始時にｶﾛﾅｰﾙ、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服										
側管点滴注射メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	1ｺｰｽ目のIR有無で異なる	○	○	○	○			
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg		○	○	○	○			
		1日1回										
		総量500mLに調製										
		(50→)100→150→200mL/h で										
		1ｺｰｽ目day1・8に100mL/h以上でIR無なら100mL/hで開始可										
		(1時間毎50mL/h up)　最大200mL/h										
		0.2又は0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
		休薬完了								●		
		以下別オーダー										
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg)（ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ）	25	mg/body	day1～21							
		1日1回　朝食後			(day22～28休薬)							
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　　（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ）	20	mg/day	day2,9,16,23(※)							
		1日1回　朝食後										
		※75歳を超える、過少体重(BMI：18.5kg・㎡未満)の患者は省略可。										
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day1・8・15・22							
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1・8・15・22							
		1日1回 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分前										
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day1-28							
		1日1回 朝食後										
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-28							
		1日1回 朝食後										