

治療スケジュール

J-51

*レジメン名	RTX+Len療法(IR無)(2-5コース目)(28日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m ² d1、レブラミド 20mg/day day1~21(Ccr30-59ml/minで10mg/day減量)

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(28)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○					
通常点滴注射 メインルート	☆	リツキシマブBS注 1日1回 100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up) リツキシマブ1mg/mLに濃度調整 リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用 最大投与速度400mL/h 無菌製剤処理料1	337.5 375	mL/m ² mg/m ²	100→200→300mL/h (30分毎100mL/h up)	○ ○					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回 流し 休薬完了	50	mL	15分	○			●		
		以下別オーダー									
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg) 1日1回 朝食後	20	mg	day1-21						
内服		カロナール錠(500mg) ポララミン錠(2mg) 1日1回 リツキシマブの30分前に	1 1	錠 錠	day1 day1						
内服		バイアスピリン錠100mg 1日1回 朝食後	1	錠	day1-28						