治療スケジュール

*レジメン名	CHASER療法(初回・IR有)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ　375mg/㎡ day1，シクロホスファミド 1200mg/㎡ day2，エトポシド 100mg/㎡ day2-4，シタラビン 2000mg/㎡ day3,4

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d()
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	337.5	mL/㎡	50→100→150mL/hで	○					
	☆	リツキシマブBS	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)									
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整									
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用									
		最大投与速度400mL/h									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○	○		
		グラニセトロン	1	mg			○	○	○		
		デキサート	33	mg			○	○	○		
		1日1回									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間		○				
	☆	エンドキサン	1200	mg/㎡			○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1(揮発性)									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○				
		1日1回									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間		○	○	○		
	☆	エトポシド	100	mg/㎡			○	○	○		
		1日1回									
		エトポシド濃度0.4mg/mLを超えると結晶析出の恐れがある									
		ため0.4mg/mL以下になるよう生食追加									
		無菌製剤処理料1									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分			○	○		
		1日1回									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間			○	○		
	☆	キロサイドN	2000	mg/㎡				○	○		
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○		
		1日1回									
		休薬完了								●	
		以下別オーダー									
皮下注射		フィルグラスチムBS注	75	μg/body	day5以降。day5は夕方(キロサイドN終了24時間後)、day6以降は午						
		1日1回									
		(ジーラスタへの変更可)									
点眼		ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNaPF眼耳鼻科用液0.5%			day2 6時からday4 6時まで6時間ごとに投与						
		1日4回　両目									
内服		カロナール錠(200mg)	2	錠	day1						
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1						
		1日1回　リツキシマブの30分前に									