治療スケジュール

J-63

*レジメン名	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ+ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ療法(皮下)(28日間)(AML)
*投与量・投与日	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ 75mg/㎡ d1-7,1ｺｰｽ目ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀd1 100mg,d2 200mg,d3-28 400mg,2ｺｰｽ目以降ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀd1-28 400mg

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(7)	d(28)
皮下注射	☆	ビダーザ注	75	mg/㎡		○	○	○	○	○	○	○	
		注射用水	20	mL	(ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ懸濁用)	○	○	○	○	○	○	○	
		1日1回											
		ビダーザ 1Vあたり**注射用水4mL**で懸濁のこと											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了											●
		以下別オーダー											
内服		グラニセトロン内服ゼリー	2	mg	前投薬	○	○	○	○	○	○	○	
		1日1回　朝食後											
1コース目	☆	ベネクレクスタ錠	100	mg		○							
		1日1回朝食後											
	☆	ベネクレクスタ錠	200	mg			○						
		1日1回朝食後											
	☆	ベネクレクスタ錠	400	mg				d3-28					
		1日1回朝食後											
2コース目以降	☆	ベネクレクスタ錠	400	mg		d1-28							
		1日1回朝食後											