# 治療スケジュール

J-74

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | DA-EPOCH-R療法[Lv.1](IR無)(21日間)(ML) |
| *投与量・投与日 | ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ375mg/㎡ day1、ｵﾝｺﾋﾞﾝ 0.4 mg/㎡ day1-4、ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg/㎡ day1-4、ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ 10mg/㎡ day1-4、ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ 750mg/㎡ day5、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠120mg/㎡/day(分2) day1-5 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(2) | d(3) | d(4) | d(5) | d(6) | d(7) | d(21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 337.5 | mL/㎡ | 100→200→300mL/h | ○ | | | | | | | |
| | ☆ | リツキシマブBS注 | 375 | mg/㎡ | (30分毎100mL/h up | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up) | | | | | | | | | | | |
| | | リツキシマブ1mg/mLに濃度調整 | | | | | | | | | | | |
| | | リツキシマブ投与30分前にポララミン 、カロナール服用 | | | | | | | | | | | |
| | | 最大投与速度400mL/h | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | グラニセトロン静注液 | 1 | mg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 1000 | mL | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | ☆ | オンコビン | 0.4 | mg/㎡ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | ☆ | エトポシド | 50 | mg/㎡ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | ☆ | ドキソルビシン | 10 | mg/㎡ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 500 | mL | 2時間 | | | | | ○ | | | |
| | ☆ | エンドキサン | 750 | mg/㎡ | | | | | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1(揮発性) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | | | | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | | | | | ● |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **以下別オーダー** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | プレドニン錠(5mg) | 120 | mg/㎡/da | day1-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 1日2回　朝昼食後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) | 1 | 錠 | day1 | ○ | | | | | | | |
| | | ポララミン錠(2mg) | 1 | 錠 | day1 | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回　リツキシマブ投与30分前 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 皮下注射 | | フィルグラスチムBS注 | 75 | μg/body | day6以降、好中球数5000/μL以上となるまで連日投与 | | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | day6は夕方(エンドキサン終了24時間後)、day7以降は午前中 | | | | | | | | |