治療スケジュール

J-80

*レジメン名	DA-EPOCH-R療法[Lv.6](IR無)(21日間)(ML)
*投与量・投与日	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ375mg/㎡ day1、ｵﾝｺﾋﾞﾝ 0.4 mg/㎡ day1-4、ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 124.4mg/㎡ day1-4、ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ 24.8mg/㎡ day1-4、ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ 1866mg/㎡ day5、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠 120mg/㎡/day(分2) day1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(7)	d(21)
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	337.5	mL/㎡	100→200→300mL/h	○							
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎100mL/h up	○							
		1日1回											
		100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up)											
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整											
		リツキシマブ投与30分前にポララミン 、カロナール服用											
		最大投与速度400mL/h											
		無菌製剤処理料1											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	○	○			
		グラニセトロン静注液	1	mg		○	○	○	○	○			
		1日1回											
		(day5のみ)開始30分前にアプレピタント内服											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	1000	mL	24時間	○	○	○	○				
	☆	オンコビン	0.4	mg/㎡		○	○	○	○				
	☆	エトポシド	124.4	mg/㎡		○	○	○	○				
	☆	ドキソルビシン	24.8	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間					○			
	☆	エンドキサン	1866	mg/㎡						○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○			
		1日1回											
		休薬完了											●
		以下別オーダー											
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	120	mg/㎡/da	day1-5	○	○	○	○	○			
		1日2回　朝昼食後											
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1	○							
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1	○							
		1日1回　リツキシマブ投与30分前											
内服		アプレピタントCap	125	mg	day5					○			
		1日1回 エンドキサン開始60分前											
内服		アプレピタントCap	80	mg	day6,7						○	○	
		1日1回　朝食後											
皮下注射		フィルグラスチムBS注	75	μg/body	day6以降、好中球数5000/μL以上となるまで連日投与								
		1日1回			day6は夕方(エンドキサン終了24時間後)、day7以降は午前中								