治療スケジュール

J-85

*レジメン名	EPd療法(2コース目)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	エムプリシティ 10mg/kg day1.8.15.22、ポマリスト 4mg/day day1-21、レナデックス 40mg/day　day1.8.15.22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	
		ポララミン注	5	mg		○	○	○	○	
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	○	
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	○	
		1日1回								
		点滴開始2時間前までにレナデックス内服								
		点滴開始時にカロナール内服								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	45分	○	○	○	○	
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	230	mL		○	○	○	○	
		注射用蒸留水100mL	1	本	(エムプリシティ溶解用)	○	○	○	○	
	☆	エムプリシティ	10	mg/kg	IR歴なければ、300mL/hで開始可能	○	○	○	○	
		1日1回			300mL/hを超えないこと					
		生理食塩液250mLから20mL抜き230mLとして使用								
		0.22μmフィルター使用								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	
		1日1回								
		流し								
		休薬完了								●
		以下別オーダ								
内服	☆	ポマリストカプセル	4	mg	day1-21					
		1日1回　朝食後								
		(Ccrに準じて減量する)								
内服	☆	レナデックス錠	28	mg	day1・8・15・22					
		1日1回　抗がん剤投与3時間前までに内服								
		(75歳を超える場合は8mg/週)								
内服		カロナール錠	500	mg	day1・8・15・22					
		1日1回　前投薬開始前内服								
内服		アシクロビル錠(200mg)	1	錠	予防内服					
		1日1回　朝食後								
内服		バイアスピリン錠(100mg)	1	錠	予防内服					
		1日1回　朝食後								
内服		ランソプラゾールOD錠(15mg)	1	錠	予防内服					
		1日1回　朝食後								