

レジメン登録フォーマット

J-86

*レジメン名	EPd療法(3コース目)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	エムプリシティ 20mg/kg day1、ポマリスト 4mg/day day1-21、レナデックス 40mg/day day1,8,15,22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(28)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	
		ポララミン注	5	mg		○	
		ファモチジン注	20	mg		○	
		デキサート注	6.6	mg		○	
		1日1回					
		点滴開始2時間前までにレナデックス内服					
		点滴開始時にカロナール内服					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液100mL	100	mL	45分	○	
		1日1回					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL		○	
		注射用蒸留水100mL	230	mL	(エムプリシティ溶解用)	○	
	☆	エムプリシティ	1	本	IR歴なければ、300mL/hで開始可能	○	
		1日1回	20	mg/kg	300mL/hを超えないこと		
		生理食塩液250mLから20mL抜き230mLとして使用					
		0.22μmフィルター使用					
		無菌製剤処理料1					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	
		1日1回					
		流し					
		休薬完了					●
		以下別オーダー					
内服	☆	ポマリストカプセル	4	mg	day1-21		
		1日1回 朝食後					
		(Ccrに準じて減量する)					
内服	☆	レナデックス錠	28	mg	day1		
		1日1回 抗がん剤投与3時間前までに内服					
		(75歳を超える場合は8mg/週)					
内服	☆	レナデックス錠	40	mg	day8・15・22		
		1日1回 朝食後					
		(75歳を超える場合は20mg/週)					
内服		カロナール錠	500	mg	day1		
		1日1回 前投薬開始前内服					
内服		アシクロビル錠(200mg)	1	錠	予防内服		
		1日1回 朝食後					
内服		バイアスピリン錠(100mg)	1	錠	予防内服		
		1日1回 朝食後					
内服		ランソプラゾールOD錠(15mg)	1	錠	予防内服		
		1日1回 朝食後					