# 治療スケジュール

J-96

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | DPd療法(皮下)(3～6ｺｰｽ目)(28日間)(MM |
| *投与量・投与日 | ダラツムマブ 1,800mg day1,15、ポマリドミド 4mg day 1-21、デキサメタゾン 20mg day1,2,8,9,15,16,22,23 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(15) | d( 28) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮下注射 | ☆ | ダラキューロ配合皮下注 | 1800 | mg | 3～5分 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| | | ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にｶﾛﾅｰﾙ,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ,ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ服用 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **以下別オーダー** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | ポマリストカプセル | 4 | mg | day1-21 | | | | | | | | |
| | | 1日1回朝食後 | | | | | | | | | | | |
| | | (Ccrに準じて減量する) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | レナデックス錠(4mg)　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) | 5 | 錠 | day1,2,8,9,15,16,22,23 | | | | | | | | |
| | | 1日1回　朝食後 | | | (40mg/週となるよう1日もしくは2日に分けて内服) | | | | | | | | |
| | | day1,15は、ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前に内服。 | | | | | | | | | | | |
| | | (75歳を超える場合は20mg/週) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) | 2 | 錠 | day1,15 | | | | | | | | |
| | | ポララミン錠(2mg) | 1 | 錠 | day1,15 | | | | | | | | |
| | | 1日1回 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | アシクロビル錠(200mg) | 1 | 錠 | 予防内服 | | | | | | | | |
| | | 1日1回　朝食後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | バイアスピリン錠(100mg) | 1 | 錠 | 予防内服 | | | | | | | | |
| | | 1日1回　朝食後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | ランソプラゾールOD錠(15mg) | 1 | 錠 | 予防内服 | | | | | | | | |
| | | 1日1回　朝食後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |