治療スケジュール

J-98

*レジメン名	R-MPV療法(初回・IR有)(14日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375 mg/㎡ day1、メトトレキサート 3500mg/㎡ day2, ビンクリスチン 1.4 mg/㎡ day2, プロカルバジン 100 mg/㎡ day 2-8(奇数コースのみ)

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(14)
中心静脈注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	4時間	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	
		メイロン静注7%	40	mL							
		ルート①									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					
		1日1回				○					
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	337.5	mL/㎡	50→100→150mL/hて	○					
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○					
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)									
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整									
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用									
		最大投与速度400mL/h									
		無菌製剤処理料1									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○				
		パロノセトロン注	0.75	mg			○				
		デキサート注	6.6	mg			○				
		1日1回									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○	○		
		デキサート注	6.6	mg				○	○		
		1日1回									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○				
		ダイアモックス注	500	mg			○				
		1日1回									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	全開		○				
	☆	オンコビン	1.4	mg/㎡			○				
		1日1回									
		オンコビン最大投与量　2mg/body									
		無菌製剤処理料1									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○				
		1日1回									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	4時間		○				
	☆	メソトレキセート点滴静注液	3,500	mg/㎡			○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○				
		1日1回									
		ルート②									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○*4	○*5			
		ロイコボリン注	15	mg			○*4	○*5			
		メソトレキセート注投与終了3時間後から、3時間毎(計9回)									
		ルート②(ルート①と混合させない)									
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○*2	○*4	○*2	
		ロイコボリン注	15	mg				○*2	○*4	○*2	
		メソトレキセート注投与終了30時間後から、6時間毎(計8回)									
		ルート②(ルート①と混合させない)									
		休薬完了									●
		以下別オーダー									
内服	☆	塩酸プロカルバジンカプセル	100	mg/㎡/da	奇数コースのday2-8						
		1日2回									
内服		クエンメット配合錠	6	錠/day	day1からロイコボリン注投与終了まで内服						
		1日3回									
内服		カロナール錠(200mg)	2	錠	day1	○					
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1	○					
		1日1回　リツキシマブの30分前に									