治療スケジュール

L-1

*レジメン名	CBDCA+ETP療法(21日間)(NEC)
*投与量・投与日	カルボプラチン　AUC=5　d1、　エトポシド　80mg/㎡　d1、2、3

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		デキサート注射液	4.95	mg		○					
		グラニセトロン注射液1mg	1	A		○					
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○			
		デキサート注射液	3.3	mg			○	○			
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	500	mL	2時間	○	○	○			
	☆	エトポシド注	80	mg/㎡		○	○	○			
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	90分	○					
	☆	カルボプラチン注	AUC=5			○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	2時間	○	○	○			
		1日1回									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1						
		1日1回　朝									
		点滴開始1時間前									
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3						
		1日1回　朝食後									