治療スケジュール

L-2

*レジメン名	CDDP+ETP療法(21日間)(NEC)
*投与量・投与日	エトポシド100mg/㎡ day1,2,3　シスプラチン 80mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		パロノセトロン注	0.75	mg		○						
		デキサート注	9.9	mg		○						
		1日1回										
		メイン①　開始30分前にアプレピタント内服										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分		○	○				
		デキサート注	9.9	mg			○	○				
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○				
	☆	エトポシド注	100	mg/㎡		○	○	○				
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		メイン②(day1)										
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○						
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○						
		1日1回										
		側管②　エトポシドと同時投与										
通常点滴注射　メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分	○						
		1日1回										
		メイン③										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○						
	☆	シスプラチン注	80	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		メイン④										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○						
		1日1回										
		メイン⑤										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○				
		1日1回										
		休薬完了								●		
		以下別オーダー										
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	d1	○						
		1日1回(エトポシド開始の1時間前)										
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	d2,3		○	○				
		1日1回　朝食後										
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4	○	○	○	○			
		1日1回　眠前										
内服		デカドロン錠	8	mg	d4				○			
		1日2回　朝昼食後										