

治療スケジュール

M-1

*レジメン名	TC療法(21日間)(原発不明)
*投与量・投与日	パクリタキセル 175~200mg/m ² d1, カルボプラチン AUC5~6 d1

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート①		生理食塩水	50	mL	15分	○			
		デキサート注	19.8	mg		○			
		ファモチジン注	20	mg		○			
		1日1回							
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服							
通常点滴注射 メインルート②		生理食塩水	100	mL	30分	○			
		グラニセトロン 1mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート③		生理食塩水	500	mL	3時間	○			
	☆	パクリタキセル	200	mg/m ²		○			
		1日1回							
		0.22 μmフィルター使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート④		生理食塩水	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート⑤		生理食塩水	500	mL	2時間	○			
	☆	カルボプラチン	6	AUC		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート⑥		生理食塩水	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服		レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	d1 朝				
		1日1回 1本目の点滴開始時							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2-3				
		1日2回 朝昼食後							